

Problema 748: Dispónese dunha disolución que contén unha concentración de Cd^{2+} de 1,1 mg/L.

Quérese eliminar parte do Cd^{2+} precipitándoo cun hidróxido, en forma de $\text{Cd}(\text{OH})_2$. Calcula:

a) O pH necesario para iniciar a precipitación.

b) A concentración de Cd^{2+} , en mg/L, cando o pH é igual a 12. Dato: $K_s \text{ Cd}(\text{OH})_2 = 1,2 \cdot 10^{-14}$

a) Partimos do equilibrio de solubilidade do $\text{Cd}(\text{OH})_2$.



$$[\text{Cd}^{2+}] = 1,1 \frac{\text{mg}}{\text{L}} \cdot \frac{1 \text{g}}{1000 \text{mg}} \cdot \frac{1 \text{mol}}{112,4 \text{g}} = 9,79 \cdot 10^{-6} \text{ M}$$

$$K_s = [\text{Cd}^{2+}] \cdot [\text{OH}^{-}]^2$$

$$[\text{OH}^{-}] = \sqrt{\frac{K_s}{[\text{Cd}^{2+}]}} = \sqrt{\frac{1,2 \cdot 10^{-14}}{9,79 \cdot 10^{-6}}} = 3,50 \cdot 10^{-5} \text{ M}$$

$$p\text{OH} = -\log [\text{OH}^{-}] = -\log 3,50 \cdot 10^{-5} = 4,46$$

$$p\text{H} = 14 - p\text{OH} = 14 - 4,46 = 9,54$$

b) Do pH deducimos a concentración de OH^{-} , e a partir desta a concentración de Cd^{2+}

$$p\text{OH} = 14 - p\text{H} = 14 - 12 = 2$$

$$[\text{OH}^{-}] = 10^{-p\text{OH}} = 10^{-2} \text{ M}$$

$$K_s = [\text{Cd}^{2+}] \cdot [\text{OH}^{-}]^2$$

$$[\text{Cd}^{2+}] = \frac{K_s}{[\text{OH}^{-}]^2} = \frac{1,2 \cdot 10^{-14}}{(1 \cdot 10^{-2})^2} = 1,2 \cdot 10^{-10} \text{ M}$$

$$[\text{Cd}^{2+}] = 1,2 \cdot 10^{-10} \frac{\text{mol}}{\text{L}} \cdot \frac{112,4 \text{g}}{1 \text{mol}} \cdot \frac{1000 \text{mg}}{1 \text{g}} = 1,35 \cdot 10^{-5} \text{ mg/L}$$