

Problema 758: Disólvense 46 g de ácido metanoico, HCOOH, en 10 L de auga, obtendo unha disolución de pH igual a 2,52.

a) Calcule o grao de disociación do ácido.

b) Determine a constante K_a do ácido e a constante K_b da súa base conxugada ABAU-Xuño-2022

a)

$$[HCOOH] = \frac{n}{V} = \frac{m_s}{M_m \cdot V} = \frac{46\text{ g}}{46\text{ g/mol} \cdot 10\text{ L}} = 0,1\text{ M}$$

| | | | | |
|---------|--------------------------|----------------------|-----------------------------------|---|
| | HCOOH + H ₂ O | \rightleftharpoons | HCOO ⁻ _(aq) | + H ₃ O ⁺ _(aq) |
| [inic.] | 0,1 | — | — | — |
| [eq.] | 0,1 - x | x | x | x |

Se coñecemos o pH dunha disolución podemos coñecer a concentración de protóns.

$$x = [H_3O^{+1}] = 10^{-pH} = 10^{-2,52} = 3,02 \cdot 10^{-3}\text{ M}$$

$$[HCOOH]_{eq} = 0,1 - x = 0,1 - 3,02 \cdot 10^{-3} = 0,097\text{ M}$$

$$[H_3O^{+1}]_{eq} = x = 3,02 \cdot 10^{-3}\text{ M}$$

$$[HCOO^{-1}]_{eq} = x = 3,02 \cdot 10^{-3}\text{ M}$$

Grao de disociación:

$$\alpha = \frac{\text{Cant. disociada}}{\text{Cant. inicial}} \cdot 100 = \frac{x}{0,1} \cdot 100 = \frac{3,02 \cdot 10^{-3}}{0,1} \cdot 100 = 3,02\%$$

b)

$$K_a = \frac{[HCOO^{-1}] \cdot [H_3O^{+1}]}{[HCOOH]} = \frac{(3,02 \cdot 10^{-3})^2}{0,097} = 9,4 \cdot 10^{-5}$$

$$K_b = \frac{K_w}{K_a} = \frac{1 \cdot 10^{-14}}{9,4 \cdot 10^{-5}} = 1,06 \cdot 10^{-10}$$